

## **ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „RAUDONKEPURAITĖ“ PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ (toliau – Lopšelio-darželio) pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pirmosios pagalbos organizavimą Įstaigoje.

2. Aprašą įgyvendina Lopšelio-darželio darbuotojai ir kiti teisės aktais numatyti darbuotojai.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašu“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašu“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (aktualiomis suvestinė redakcijomis).

### **II SKYRIUS PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS**

4. Pirmoji pagalba – tai paprasti tikslingi veiksmai, naudojant turimas pirmosios pagalbos teikimo priemones ar kitokias priemones bei medžiagas, siekiant išsaugoti nukentėjusiojo gyvybę ar sustabdyti sveikatai žalingus veiksmus (Priedas Nr. 1).

5. Lopšelis-darželis privalo sudaryti saugias ugdymo ir darbo sąlygas ugdytiniams ir darbuotojams.

6. Lopšelio-darželio darbuotojai gali dirbti tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą, įgiję higienos žinių ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei turėti tai patvirtinančius galiojančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.

7. Mokytojas turi užtikrinti vaikų saugumą ugdymo proceso, organizuotų renginių, sporto varžybų, išvykų ir ekskursijų metu.

8. Lopšelio-darželio muzikos, sporto salėje, gerai matomoje vietoje ir sveikatos kabinete turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto reikalavimus.

9. Rinkiniai turi būti lengvai pasiekiami ugdymo metu įstaigos darbuotojams.

10. Už pirmosios pagalbos rinkinio priežiūrą atsakingas visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, jo papildymą - Lopšelio-darželio ūkvedys.

11. Pirmosios pagalbos rinkiniu gali naudotis asmenys, teikiantys pirmąją pagalbą.

12. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, visus vaikų apsilankymus pas specialistą dėl traumos, nelaimingo atsitikimo, negalavimo, registruoja Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vidaus nustatyta tvarka.

13. Lopšelyje-darželyje įvykusios traumos, įvykiai nelaimingo atsitikimo metu registruojami įstaigos bei teisės aktu nustatyta tvarka:

13.1. Nelaimingus atsitikimus registruoja Lopšelio darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

13.2. Naudojami registravimo žurnalai ir formos-aktai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 02 11 įsakymu Nr. 113.

14. Kilus grėsmei vaiko gyvybei arba esant ūmiai pavojingai sveikatos būklei, pirmąją pagalbą teikia asmuo, esantis arčiausiai nukentėjusiojo. Įvertinus nukentėjusiojo būklę, jeigu reikalinga, pagalbą teikiantis arba šalia jo esantis asmuo kviečia GMP.

15. Prieš pradėdant teikti pirmąją pagalbą, užtikrinamas situacijos saugumas.

16. Ūmiai susirgus vaikui ar įvykus nelaimingam atsitikimui, įstaigos darbuotojai nedelsdami apie vaiko sveikatos būklę informuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistą jam esant įstaigoje (jo darbo valandomis), vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus), Lopšelio-darželio direktoriui (jam nesant – direktoriaus pavaduotoją ugdymui), kitas institucijas.

17. Nelaimingo atsitikimo metu nukentėjęs vaikas vienas nepaliekamas.

18. Įvykus traumai, nelaimingam atsitikimui, incidentui ar sužinojus apie juos, įstaigos darbuotojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (jam esant įstaigoje), nedelsiant teikia pirmąją pagalbą, kviečia greitąją medicinos pagalbą (toliau - GMP), tel. 112, praneša nukentėjusio tėvams (globėjams, rūpintojams), Lopšelio-darželio direktoriui (jam nesant – direktoriaus pavaduotojui ugdymui).

16. Iškvietus GMP, kol atvyks tėvai (globėjai, rūpintojai), jei vaikas gabenamas į gydymo įstaigą, ji lydi mokytoja, dirbusi su vaikais. Likusių ugdytinių sveikatą ir saugumą, išvykus mokytojai, užtikrina Lopšelio-darželio direktorius (jam nesant – direktoriaus pavaduotojas ugdymui).

17. Kiekviena situacija ar nelaimingas atsitikimas analizuojami įstaigoje ir tam pritaikomos prevencinės priemonės (Priedas Nr. 2).

### **III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

18. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia įstaigos bendruomenę (pedagogus, vaikus, jų tėvus (globėjus).

19. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir koreguojamas pasikeitus jį reglamentuojantiems teisės aktams.

20. Aprašas skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje [www.raudonkepuraite.lt](http://www.raudonkepuraite.lt).

21. Darbuotojai su Aprašu supažindinami padalinių vadovų, kuratorių ir elektronine dokumentų valdymo sistema DVS.

22. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo Lopšelio-darželio direktorius.

---

## VEIKSMAI, SIEKIANT IŠSAUGOTI NUKENTĖJUSIOJO GYVYBĘ AR SUSTABDYTI SVEIKATAI ŽALINGUS VEIKSMUS

### I SKYRIUS PIRMOJI PAGALBA KRAUJUOJANT

1. Kraujavimas labai pavojingas žmogaus gyvybei, nes nukraujavus gali sutrikti gyvybiškai svarbių organų veikla, gali ištikti šokas, netekęs daug kraujo, žmogus gali mirti. Todėl kraujavimą reikia kuo skubiau stabdyti.

2. Kraujavimas gali būti išorinis (kai pažeistas odos vientisumas ir kraujuoja iš akimi matomos žaizdos) ir vidinis (tai nematomas kraujavimas į vidines kūno dalis – krūtinės, pilvo ertmės, tarp raumenų).

3. Įtarti vidinį kraujavimą reikėtų esant šiems požymiams:

- 3.1. nerimas;
- 3.2. silpnumas;
- 3.3. troškulys;
- 3.4. krečia drebulys, pila šaltas prakaitas;
- 3.5. žmogus išblykšta;
- 3.6. kvėpavimas dažnas, paviršutinis;
- 3.7. pulsas dažnas, silpnas;
- 3.8. žmogus gali prarasti sąmonę, kristi.

4. Įtarus vidinį kraujavimą, nukentėjusiajam reikėtų suteikti patogią kūno padėtį, dėti šalčio kompresus, kuo greičiau organizuoti gabenimą į gydymo įstaigą.

5. Esant išoriniam kraujavimui:

- 5.1. užsimauti pirštines arba panaudoti kitą skysčiui nelaidžią medžiagą;
- 5.2. nuvilkti nukentėjusiajam drabužius arba juos apkirpti, kad matytųsi kraujuojanti vieta;
- 5.3. kraujuojančią vietą užspausti tvarščiu (jeigu sterilaus tvarščio nėra, galima panaudoti švarų audinį (nosinę, skarelę arba užspausti rankomis, nukentėjusysis gali pats, savo rankomis, užspausti kraujuojančią žaizdą);
- 5.4. sutvarstyti;
- 5.5. jeigu kraujavimo sustabdyti nepavyko (krauju permirkusių tvarščių nuimti negalima), ant viršaus dėti spaudžiamąjį tvarstį (pvz.: standžiai susuktą audinio ritinėlį);
- 5.6. kaip pagalbinę kraujavimo stabdymo priemonę galima naudoti galūnės pakėlimą arba maksimalų sulenkimą;
- 5.7. varžtu stabdyti kraujavimo nerekomenduojama;
- 5.8. kraujuojant galvos srityje, nukentėjusiojo neguldyti;
- 5.9. kraujuojant iš nosies, nukentėjusįjį reikia nuraminti, pasodinti, papašyti palenkti galvą į priekį, užspausti nosies sparnelius, ant nosies kaulinės dalies ir kaktos dėti šalčio kompresus.

### II SKYRIUS PIRMOJI PAGALBA NETEKUS SĄMONĖS

6. Jei nėra galvos ar stuburo traumos požymių, kvėpuojantį, bet nesąmoningą nukentėjusįjį reikia paguldyti į stabilią šoninę padėtį. Ji palaiko atvirus kvėpavimo takus:

- 6.1. priklaupti šalia nukentėjusiojo ir ištiesti jo kojas;
- 6.2. arčiau esančią ranką sulenkti per peties ir alkūnės sąnarius stačiais kampais;
- 6.3. delną atversti aukštyje;
- 6.4. kitą ranką permesti per krūtinės ląstą, prie skruosto;
- 6.5. sulenkti toliau nuo savęs esančią koją stačiu kampu per klubo ir kelio sąnarius;
- 6.6. uždėti rankas ant tolesnių peties bei klubo arba kelio sąnarių ir vienodai paversti ant šono;

- 6.7. viršutinės rankos delną pakišti po apatiniu žandu;
- 6.8. viršutinę koją sulenkti stačiu kampu;
- 6.9. atlošti galvą, taip užtikrindami atvirus kvėpavimo takus;
- 6.10. po skruostu pakišus delną galva turi būti stabili;
- 6.11. pakartotinai vertinti gyvybines organizmo funkcijas.
- 7. Galvos smegenų trauma. Svarbiausias galvos smegenų traumos požymis – sąmonės sutrikimas. Netekęs sąmonės žmogus nesugeba reaguoti į išorinius dirgiklius.
  - 8. Patyrus galvos smegenų traumą, netekus sąmonės gali:
    - 8.1. užkristi liežuvio šaknis;
    - 8.2. išnykti kosulio ar rijimo refleksai;
    - 8.3. sustoti kvėpavimas;
    - 8.4. žmogus gali užspringti krauju, skrandžio turiniu, gali uždusti.
  - 9. Galvos smegenų traumas požymiai:
    - 9.1. kraujavimas iš nosies, burnos, ausies;
    - 9.2. gelsvo ar kraujingo skysčio tekėjimas iš ausų;
    - 9.3. nosies ar galvos žaizdos;
    - 9.4. mėlynės aplink akis, už ausų;
    - 9.5. galvos ar veido asimetrija, deformacija;
    - 9.6. stiprūs galvos skausmai;
    - 9.7. vietinis galvos audinių patinimas;
    - 9.8. sunkėjanti sąmonės būklė arba visiškas jos netekimas;
    - 9.9. vienos akies vyzdžio išsiplėtimas;
    - 9.10. vienos pusės rankos ir kojos silpnumas ar paralyžius.
  - 10. Pirmoji pagalba galvos smegenų traumas atveju:
    - 10.1. jei nukentėjusysis sąmoningas, nuraminti ir suteikti jam patogią kūno padėtį;
    - 10.2. kviesti GMP;
    - 10.3. sekti nukentėjusiojo sąmonę, kvėpavimą ir kraujotaką;
    - 10.4. jei yra atvira žaizda, uždėti spaudžiamąjį tvarstį;
    - 10.5. jei sąmonės netekimas buvo trumpalaikis, nepalikti nukentėjusiojo, sekti jo būklę;
    - 10.6. jei nukentėjusysis nesąmoningas, atverti kvėpavimo takus, pakelti apatinį žandikaulį, įvertinti kvėpavimą, pasirengti prireikus daryti įpūtimus ir krūtinės ląstos paspaudimus.
  - 11. Stuburo traumas požymiai:
    - 11.1. skausmas kaklo ar nugaros srityje;
    - 11.2. iškrypimas ar išsigaubimas nuo normalios stuburo ašies;
    - 11.3. patinimas pažeidimo vietoje.
  - 12. Kai patyrus stuburo traumą pažeistos nugaros smegenys:
    - 12.1. išnykusi judesių kontrolė galūnėse žemiau pažeidimo;
    - 12.2. išnykę ar nenormalūs jutimai (deginimas, dilgčiojimas), galūnė nejudri, sunki ar suglebusi;
    - 12.3. išnykusi šlapinimosi ir tuštinimosi kontrolė;
    - 12.4. sunku kvėpuoti.
  - 13. Pirmoji pagalba stuburo traumas atveju (esant sąmonei):
    - 13.1. nukentėjusiajam neleisti judėti;
    - 13.2. kviesti GMP (tel. 033 arba tel. 112);
    - 13.3. paprašyti šalia esančiųjų iš rūbų padaryti volelius ir jais fiksuoti galvą neutralioje pozicijoje;
    - 13.4. sekti pagrindines gyvybines funkcijas (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą).
  - 14. Jeigu nukentėjusysis nesąmoningas, sustojo kvėpavimas ir širdies veikla, pradėti gaivinti. Pagal galimybes reikia stengtis apsaugoti stuburą nuo judesių. Tačiau tai neturi trukdyti gaivinimui.

### III SKYRIUS PIRMOJI PAGALBA ESANT TRAUKULIAMS

15. Traukuliai – tai nevalingi, nekontroliuojami, pasikartojantys raumenų susitraukimai. Gali būti didieji (išplitę visame kūne) ir mažieji.

16. Atsiranda, jei sergama epilepsija, yra galvos smegenų auglys, įvykus galvos trauma, apsinuodijus įvairiomis cheminėmis medžiagomis. Vaikams gali atsirasti labai stipriai karščiuojant.

17. Paprastai traukuliai prasideda netekus sąmonės ar jos netenkant. Dažniausiai traukuliai ištinka esant epilepsijos priepuoliui.

18. Epilepsijos priepuolio požymiai:

18.1. staigus riktelėjimas;

18.2. sustingimas;

18.3. sąmonės sutrikimas;

18.4. akių žvilgsnis į viršų ar į šoną;

18.5. ritmiški raumenų traukuliai;

18.6. veido pamėlynavimas;

18.7. kramtomieji judesiai;

18.8. nevalingas šlapinimasis;

18.9. triukšmingas kvėpavimas;

18.10. putos iš burnos.

19. Jei prasidėjus epilepsijos priepuoliui žmogus krenta, reikia pasistengti, kad kristų saugiai:

19.1. prilaikyti galvą kritimo metu;

19.2. atlaisvinti drabužius;

19.3. padėti ką nors po galva.

20. Pasibaigus traukuliams atverti kvėpavimo takus ir patikrinti kvėpavimą.

21. Esant poreikiui daromi įpūtimai ir krūtinės ląstos paspaudimai.

22. Jei nukentėjusysis kvėpuoja, jį reikia paguldyti į stabilią šoninę padėtį ir sekti jo gyvybines funkcijas.

23. Kviesti GMP.

24. Epilepsijos priepuolio atveju nereikėtų atlikti šių veiksmų:

24.1. tarp dantų nedėti jokių kietų daiktų;

24.2. neslopinti traukulių fizine jėga;

24.3. nevežti į ligoninę priepuolio metu.

#### **IV SKYRIUS PIRMOJI PAGALBA UŽSPRINGUS**

25. Žmogus užspringsta, kai svetimkūnis (maistas, smulkios žaislų dalys) užkemša kvėpavimo takus siauriausioje jų dalyje – balso klostėse. Gali būti visiškas ir dalinis.

26. Dalinio užspringimo požymiai:

26.1. žmogus išlieka sąmoningas;

26.2. žmogus gali kosėti ir kalbėti.

27. Visiško užspringimo požymiai:

27.1. nukentėjusysis negali kalbėti;

27.2. nukentėjusysis rodo visų suprantamą užspringimo ženklą (griebiasi už kaklo);

27.3. nukentėjusysis negali kalbėti paklaustas;

27.4. nukentėjusiojo kosulys silpnas, neefektyvus;

27.5. nukentėjusiajam kvėpuojant atsirado švilpesys;

27.6. nukentėjusio žmogaus kvėpavimo nepakankamumas sunkėja;

27.7. nukentėjusysis pradeda mėlti;

27.8. nukentėjusysis netenka sąmonės.

28. Pirmoji pagalba esant daliniam užspringimui:

28.1. stebėti užspringusįjį;

29.2. nepalikti nukentėjusiojo vieno;

- 29.3. jeigu nukentėjusysis kosti, netrukdyti jam (kosulys yra geriausias svetimkūnio pašalinimo iš kvėpavimo takų būdas);
- 29.4. netrankyti į nukentėjusiojo tarpumentę;
- 29.5. netaikyti Heimlichio metodo;
- 29.6. užspringimui užtrukus, kviesti GMP.
30. Pirmoji pagalba visiško užspringimo atveju:
- 30.1. 5 kartus suduoti į tarpumentę;
- 30.2. jei nukentėjusysis vis tiek išlieka užspringęs, pasinaudoti Heimlichio metodu (atsistoti ar atsiklaupyti užspringusiajam už nugaros, apkabinti jį, rankas dėti po nukentėjusiojo pažastimis, dėti vienos rankos kumštį po krūtinkauliu, kita ranka apglėbti kumštį ir staigiu trumpu judesiu (gilyn ir į viršų) spustelti 5 kartus;
- 30.3. šiuos veiksmus atlikinėti pakaitomis tol, kol žmogus atsprings arba neteks sąmonės.
31. Nukentėjusiajam netekus sąmonės, pradėti gaivinti.

## V SKYRIUS PIRMOJI PAGALBA SUSIŽEIDUS

32. Žaizda – tai audinių vientisumo pažeidimas, kuriam būdingas skausmas, kraujavimas ir žiojėjimas.
33. Žaizdos pavojingumas pasireiškia tuo, kad:
- 33.1. per žaizdą į audinius gali patekti infekcija;
- 33.2. per žaizdą galima nukraujuoti;
- 33.3. dėl žaizdos gali sutrikti kūno dalies ar organo funkcija;
- 33.4. gali ištikti šokas;
- 33.5. sužeistasis gali mirti ar likti neįgalus.
34. Žaizda tuo pavojingesnė, kuo ji yra arčiau gyvybiškai svarbių organų ar kuo stambesnė kraujagyslė ar yra pažeistas nervas.
35. Žaizdos gali būti įvairios (pjautinės, plėštinės, šautinės ir pan.). Bet kokią žaizdą būtina atidžiai apžiūrėti, sustabdyti kraujavimą sutvarstyti.
36. Žaizdų tvarstymas – tai pirmosios pagalbos būdas, naudojant įvairią tvarsliaavą (bintą, sterilius ir nesterilius tvarsčius, pleistrą, tvarstomasias skareleles ir parankines priemones) uždengiant žaizdą.
37. Žaizdų tvarstymo tikslas:
- 37.1. apsaugoti žaizdą nuo aplinkos užkrato;
- 37.2. sustabdyti kraujavimą;
- 37.3. sumažinti skausmą;
- 37.4. sugerti išsiskiriantį kraują ar skystį.
38. Žaizdų tvarstymo pagrindai:
- 38.1. tvarstyti pradėdame nuo tvarsčio galo;
- 38.2. tvarsčio plotis parenkamas atsižvelgiant į žaizdą;
- 38.3. tvarstoma nuo plonesnės kūno dalies link storesnės;
- 38.4. tvarstis turi lygiai priglusti prie kūno;
- 38.5. tvarstyti nestipriai, kad nespaustų kraujagyslių ir nervų;
- 38.6. negalima mazgo rišti ties žaizda;
- 38.7. būtina patikrinti ar nesutriko kraujotaka.
39. Žaizdų tvarstymo būdai:
- 39.1. žiedinis būdas (tinka tvarstant ranką, koją, kaktą, kaklą);
- 39.2. spiralinis būdas (tinka tvarstant lygias kūno dalis: pirštus, žastą, krūtinę, pilvą);
- 39.3. spiralinis bėgamasis su perlenkimais (toks būdas tinka pailgoms nevienodo dydžio dalims tvarstyti);
- 39.4. kryžminis aštuoniukės formos būdas (tvarstomi sąnariai);
- 39.5. tvarstymas skarelėmis (tinka tvarsčiui fiksuoti, galūnei įtvirtinti);

- 39.6. sterilios skarelės gali būti naudojamos kaip tvarstis žaizdai uždengti.  
40. Sutvarsčius žaizdą, jeigu reikia, kviesti GMP arba vežti į gydymo įstaigą.

## VI SKYRIUS PIRMOJI PAGALBA NUDEGUS

41. Nudegimai skirstomi pagal juos sukėlusią priežastį, gylį, vietą ir sunkumą.  
42. Nudegimai pagal juos sukėlusią priežastį klasifikuojami: terminis, elektrinis, cheminis, radiacinis veiksnys.  
43. Nudegimai pagal jų gylį klasifikuojami: paviršinis, vidutinio gylio, gilusis.  
44. Nudegimai pagal juos sukėlusią priežastį gali būti:  
44.1. dėl temperatūros poveikio (ugnies, įkaitusių daiktų dalių, karštų skysčių, garų ir pan.);  
44.2. dėl ultravioletinių, jonizuojančių spindulių;  
44.3. dėl elektros srovės;  
44.4. dėl cheminių medžiagų.  
45. Pirmoji pagalba esant terminiam nudegimui:  
45.1. nutraukti žalojantį aukštos temperatūros poveikį;  
45.2. vėsinti nukentėjusįjį kambario temperatūros vandeni mažiausiai 10 - 30 min.;  
45.3. vėsinimo metu numauti apyrankes, žiedus ir kt. daiktus, kurie, prasidėjus audinių tinimui, galėtų spausti nudegusią vietą;  
45.4. vėsinant nukentėjusįjį vertinti jo būklę ir teikti pagalbą, vadovaujantis ABC principu;  
45.5. stebėti ar neatsiranda šoko požymių;  
45.6. nuvilkti visus karštus, smilkstančius drabužius, jeigu prilipę – apkirpti juos;  
45.7. aptvarstyti visą nudegimo plotą sausais tvarščiais (nedėti tvarščių ant apdegusio veido);  
45.8. jeigu nudegusi galūnė, įvertinti ją;  
45.9. suteikti nukentėjusiajam patogią padėtį;  
45.10. kviesti GMP, stebėti nukentėjusiojo būklę.  
46. Pirmoji pagalba esant cheminiam nudegimui:  
46.1. skubiai nusausti skysta chemine medžiaga paveiktą vietą arba nubraukti sausas chemines medžiagas nuo kūno paviršiaus (saugoti savo rankas, užsimauti pirštines arba panaudoti kitą skysčiui nelaidžią medžiagą);  
46.2. gausiai plauti nudegusią vietą vandeni (geriausia tekančiu);  
46.3. apnuoginti nudegusią vietą, uždengti steriliu tvarščiu, sutvarstyti;  
46.4. skubiai organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą.  
47. Veiksmai paveikus elektros srovei:  
47.1. prisilietus prie įtampą turinčių įrenginių, prasideda savaiminis mėšlungiškas raumenų susitraukimas;  
47.2. jei nukentėjusysis laiko laidą rankose, pirštai gali jį taip stipriai suspausti, kad bus neįmanoma jo išlaisvinti;  
47.3. jei nukentėjęs asmuo liečia įrenginį, kuriuo teka elektros srovė, pirmiausia reikia skubiai jį išlaisvinti;  
47.4. reikia atsiminti, kad negalima liesti srovės veikiamo žmogaus, nenaudojant būtinų atsargumo priemonių (Tai pavojinga gyvybei! Būtina nedelsiant išjungti įrenginį);  
47.5. jei nukentėjusysis yra aukštai, įrenginį išjungus ir jį išlaisvinus nuo elektros srovės, jis gali nukristi, todėl reikia imtis priemonių, užtikrinančių, kad nukentėjusysis krisdamas dar labiau nesusižalotų;  
47.6. išjungus įrenginį, kartu gali būti išjungtas ir elektros apšvietimas, todėl reikia pasirūpinti apšvietimu iš kitų šaltinių;  
47.7. jeigu įrenginio išjungti negalima, reikia imtis priemonių atskirti nukentėjusįjį nuo jo liečiamų dalių, kuriomis teka elektros srovė.  
47.8. Nutraukus elektros srovės poveikį:  
47.8.1. skubiai įvertinti sąmonę, kvėpavimą ir kraujotaką;

- 47.8.2. palaikyti kvėpavimo takus atvirus;
- 47.8.3. jeigu reikia, gaivinti;
- 47.8.4. vėsinoti nudegusią vietą;
- 47.8.5. nuvilkti (apkirpti) apdegusius drabužius, numauti apyrankes, žiedus ir kt. daiktus, kurie, prasidėjus audinių tinimui, galėtų spausti nudegusią vietą;
- 47.8.6. tolesni veiksmai – kaip patyrus terminį nudegimą.
- 48. Teikiant pirmąją pagalbą nudegus, draudžiama:
- 48.1. plėsti drabužius nuo nudegusios vietos, jei jie prilipę (tokiu atveju, sterilų tvarstį dėti ant jų);
- 48.2. pradurti pūsles;
- 48.3. dėti ledą ant nudegusios vietos;
- 48.4. tvarstyti veido.
- 49. Nudegus akis reikia gausiai plauti tekančiu vandeniu 15 - 20 min.

## **VII SKYRIUS**

### **PIRMOJI PAGALBA PERKAITUS, IŠTIKUS SAULĖS SMŪGIUI**

50. Perkaitimas – tai būklė, kai sutrinka kūno temperatūros reguliacijos mechanizmas. Žmogus perkaista dėl aukštos aplinkos oro temperatūros, mažo oro srauto judėjimo, kai ilgai būna nevedinamoje patalpoje, daug ir sunkiai dirba arba sportuoja karštoje aplinkoje, karštą dieną aktyviai juda ir mažai geria vandens.

51. Aukštos temperatūros poveikis gali būti trejopas:

51.1. šiluminiai traukuliai: (apatinių galūnių, nugaros, pilvo traukuliai ir didelis prakaitavimas);

51.2. šiluminis išsekimas (galvos skausmas, silpnumas, svaigulys, pykinimas, spazmai, euforija, nerimas ar apatija, mieguistumas, odos blyškumas, šalta ir drėgna oda);

51.3. šiluminis smūgis (galvos skausmas, silpnumas, svaigulys, pykinimas, gali būti vėmimas, paraudusi sausa ir karšta oda, nukentėjusysis nebeprakaituoja, dažnas ir stiprus pulsas, aukštesnė kaip 40° temperatūra, trinka sąmonė).

52. Pirmoji pagalba esant šiluminiam išsekimui:

- 52.1. nunešti nukentėjusį į vėsią vietą;
- 52.2. atpalaiduoti arba nuvilkti drabužius, nuauti batus;
- 52.3. suvilgyti kūną vėsiu vandeniu, vėdinti;
- 52.4. duoti gerti pasūdyto vandens;
- 52.5. pakelti kojas aukščiau širdies lygio;
- 52.6. kviesti GMP, stebėti nukentėjusį.

53. Pirmoji pagalba esant šiluminiam smūgiui:

- 53.1. nunešti nukentėjusį į vėsią vietą;
- 53.2. skubiai kviesti GMP;
- 53.3. atlaisvinti arba nuvilkti drabužius;
- 53.4. esant galimybei, suvynioti į šaltą, drėgną paklodę, aktyviai vėdinti;
- 53.5. masažuoti galūnes ir odą;
- 53.6. pakelti kojas aukščiau širdies lygio;
- 53.7. jeigu sąmoningas, duoti lėtai išgerti bent stiklinę vandens.

54. Saulės smūgis – tai galvos smegenų pažeidimas dėl tiesioginio saulės spindulių poveikio galvai. Saulės spinduliams tiesiogiai krintant ant neapdengtos galvos, dirginami galvos smegenų dangalai, pakyla galvos smegenų temperatūra, todėl sutrinka smegenų funkcija. Žmogus net gali mirti nuo smegenų paburkimo.

55. Saulės smūgio požymiai:

- 55.1. galvos skausmas;
- 55.2. spengimas ausyse;
- 55.3. mirgėjimas akyse;



- 55.4. padažnėjęs kvėpavimas ir pulsas;
- 55.5. pykinimas ar vėmimas;
- 55.6. apatija;
- 55.7. išbalusi oda;
- 55.8. pila šaltas prakaitas;
- 55.9. bendras silpnumas;
- 55.10. aukšta kūno temperatūra;
- 55.11. sąmonės pritemimas ir net netekimas.
- 56. Pirmoji pagalba saulės smūgio atveju (jei nukentėjęsysis sąmoningas):
  - 56.1. nuvesti nukentėjusį į pavėsi;
  - 56.2. paguldyti arba pasodinti nukentėjusį;
  - 56.3. atlaisvinti nukentėjusiojo drabužius;
  - 56.4. nukentėjusiojo veidą apipurkšti vėsiu vandeniu;
  - 56.5. ant nukentėjusiojo galvos uždėti šaltą kompresą;
  - 56.6. nukentėjusiajam duoti atsigerti vandens.
- 57. Pirmoji pagalba saulės smūgio atveju (jei nukentėjęsysis nesąmoningas):
  - 57.1. paguldyti nukentėjusį į stabilią šoninę padėtį;
  - 57.2. vėdinti nukentėjusį;
  - 57.3. kuo skubiau organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą.

## VIII SKYRIUS PIRMOJI PAGALBA IŠTIKUS ŠOKUI

- 58. Šokas – gyvybei pavojinga būklė, atsirandanti, sutrikus kraujotakai.
- 59. Šokas gali būti:
  - 59.1. sukeltas širdies ligų;
  - 59.2. dėl nepakankamo kraujo tūrio;
  - 59.3. sukeltas infekcijos;
  - 59.4. anafilaksinis (dėl alerginės reakcijos);
  - 59.5. sukeltas nervų sistemos pažeidimo.
- 60. Šoko požymiai:
  - 60.1. pradžioje – greitas pulsas, pilkšva, šalta oda, prakaitavimas;
  - 60.2. šokui pasunkėjus – melsvai pilka oda, silpnumas ir galvos svaigimas, pykinimas, gali būti ir vėmimas, troškulys, dažnas ir paviršinis kvėpavimas, siūlinis silpnas pulsas;
  - 60.3. sumažėjus smegenų aprūpinimui deguonimi, pasireiškia – neramumas ir agresyvumas, žiovulys ir žiopčiojimas (“oro gaudymas”), sąmonės netekimas, galiausiai išnyksta širdies veikla.
- 61. Pirmoji pagalba ištikus šokui:
  - 61.1. būtina šalinti galimą šoko priežastį (pvz., stabdyti kraujavimą);
  - 61.2. paguldyti nukentėjusį ant antklodės;
  - 61.3. nuraminti nukentėjusį;
  - 61.4. jei nukentėjęsysis nepatyrė traumos, pakelti ir palaikyti jo kojas, kad pagerėtų gyvybei svarbių organų aprūpinimas krauju;
  - 61.5. jei įtariamas lūžimas, įtvirtinti;
  - 61.6. apkloti nukentėjusiojo kūną ir kojas;
  - 61.7. kviesti GMP;
  - 61.8. jei nukentėjęsysis vemia, ar jam teka seilės, pasukti galvą į šoną;
  - 61.9. sekti pagrindines gyvybines funkcijas (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą).
- 62. Anafilaksinis šokas – tai sunki alerginė reakcija, sutrikdanti viso organizmo veiklą.
- 63. Anafilaksinio šoko požymiai (pagal sistemas):
  - 63.1. kraujospūdžio kritimas, greitas širdies plakimas (širdies ir kraujagyslių sistema);
  - 63.2. ryškus dusulys (kvėpavimo sistema);
  - 63.3. bėrimas, veido, vokų, liežuvio patinimas (oda, gleivinės);

- 63.4. pilvo skausmai, viduriavimas, vėmimas (virškinimo sistema);  
 63.5. nerimas.  
 64. Pirmieji požymiai gali atsirasti po kelių sekundžių ar minučių, bet gali ir po 2 valandų.  
 65. Pirmoji pagalba ištikus anafilaksiniam šokui:  
 65.1. kviesti GMP;  
 65.2. paklausti ar nukentėjusysis turi reikiamus vaistus, jei turi, padėti jais pasinaudoti;  
 65.3. jei žmogus sąmoningas, suteikti jam patogią padėtį, jeigu dūsta – pasodinti, jei jaučia silpnumą, svaigsta galva – paguldyti ir pakelti kojas;  
 65.4. nuraminti nukentėjusįjį;  
 65.5. atpažinę šoką teikti nukentėjusiajam pagalbą.

## **IX SKYRIUS PIRMOJI PAGALBA LŪŽUS KAULAMS**

66. Kaulo lūžis – kaulo vientisumo suardymas.  
 67. Kaulo lūžio požymiai:  
 67.1. lūžio vietoje gali būti patinimas, kraujosruvos;  
 68.2. galūnės deformacija;  
 68.3. skausmas, galūnės judrumas neįprastoje vietoje;  
 68.4. galūnė gali būti sutrumpėjusi ar neįprastai pakreipta, persukta, sulenкта;  
 68.5. lūžio vietoje jaučiamas ar girdimas traškėjimas;  
 68.6. sutrikusi pažeistos galūnės funkcija;  
 68.7. dėl kai kurių lūžių (šlaunikaulio, dubens kaulų) gali ištikti šokas.  
 69. Pirmoji pagalba kaulo lūžio atveju:  
 69.1. perspėti nukentėjusįjį, kad nejudintų pažeistos kūno dalies;  
 69.2. prilaikyti nukentėjusiojo sužalotą vietą savo rankomis;  
 69.3. įtvirtinti pažeistą vietą taip, kad sąnariai aukščiau ir žemiau pažeidimo vietos nejudėtų;  
 69.4. naudoti turimas priemones – standžius, kietus ir siaurus įtvarus (lenteles, surištas medžių šakeles, kartoną, standžiai susuktus laikraščius ir žurnalus);  
 69.5. įtvarą pritvirtinti prie sužeistos kūno dalies tvarsčiu ar skarele;  
 69.6. pažeistą galūnę pritvirtinti prie šalia esančios sveikos kūno dalies ar galūnės;  
 69.7. kviesti GMP;  
 69.8. įtariant šoką, pakelti sveikąją koją, sužeistosios galūnės nejudinti.

## **X SKYRIUS PIRMOJI PAGALBA Į KŪNĄ ĮSMIGUS AR PATEKUS SVETIMKŪNIUI**

70. Pirmoji pagalba esant į kūną įsmigusiems daiktams:  
 71.1. jei iš žaizdos kyšo koks nors svetimkūnis – jokių būdų nebandyti jo traukti, nes gali prasidėti ar sustiprėti vidinis kraujavimas;  
 71.2. jeigu nukentėjusysis sąmoningas leisti jam būti tokioje padėtyje, kuri jam yra patogiausia;  
 71.3. stengtis išlaikyti stabilią nukentėjusiojo padėtį;  
 71.4. nuraminti nukentėjusįjį;  
 71.5. svetimkūnį uždengti tvarsčiu, aplink dėti tvarsčių arba švaraus audinio ritinėlius, kurie uždengtų visą svetimkūnį, švelniai nespaudžiant sutvarstyti;  
 71.6. skubiai kviesti GMP arba organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą.  
 72. Pirmoji pagalba svetimkūniui patekus į akis:  
 72.1. patekus į akį cheminėms medžiagoms, plauti ją 30 – 40 minučių šaltu arba drungnu tekančiu vandeniu;  
 72.2. vandeniu išplovus akis, šlapiais tamponais kruopščiai nuvalyti odos vietas, ant kurių pateko nuodingas skystis;

- 72.3. tą patį reikia padaryti ir nudegus akis;
- 72.4. patekus dulkėms, taip pat plauti vandeniu, nukentėjusiajam patarti dažnai mirksėti, nes mirksint dulkės pasišalina;
- 72.5. į akį patekus svetimkūniui, perspėti nukentėjusį, kad netrintų akies;
- 72.6. dviem pirštais išplėsti akį, svetimkūnį esantį vidiniame apatinio voko paviršiuje pašalinti švaria drėgna servetėle;
- 72.7. akį nupilti vandeniu, galvą laikyti taip, kad vanduo nepatektų į sveiką akį;
- 72.8. jeigu giliai akyje įstrigusi drožlė ar kristalas, nieko nedaryti (mėginant iš akies traukti svetimkūnį, galima nepagydomai pažeisti akies audinius).
73. Pirmoji pagalba svetimkūniui patekus į nosį:
- 73.1. nuraminti nukentėjusį;
- 73.2. liepti nukentėjusiajam kvėpuoti pro burną;
- 73.3. gabenti nukentėjusį į gydymo įstaigą.
74. Pirmoji pagalba svetimkūniui patekus į ausį:
- 74.1. nuraminti nukentėjusį;
- 74.2. jei ausyje gyvas vabzdys, pilti į nukentėjusiojo ausį šilto vandens;
- 74.3. uždengti nukentėjusiojo ausį tvarščiu ir, kiek įmanoma greičiau, gabenti į gydymo įstaigą.

## **XI SKYRIUS**

### **PIRMOJI PAGALBA APSINUODIJUS**

75. Nuodai – tai medžiaga, kurios tam tikras kiekis, patekęs į organizmą, gali sukelti trumpalaikį ar nuolatinį audinių pažeidimą.
76. Apsinuodijimo būdai:
- 76.1. pro burną (nuryjant);
- 76.2. per odą;
- 76.3. įkvepiant;
- 76.4. per akis;
- 76.5. injekciniu būdu (suleidus ar įgėlus).
77. Apsinuodijus reikėtų nedelsiant skambinti Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonu **85 236 20 52 arba 8 687 53 378**.
78. Pirmoji pagalba nuodams patekus pro burną:
- 78.1. užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą, kvėpavimą ir kraujotaką;
- 78.2. jei įmanoma, nustatyti, kuo apsinuodyta;
- 78.3. pasirūpinti, kad nukentėjusysis kuo greičiau patektų į ligoninę;
- 78.4. jei nukentėjusysis yra sąmoningas, paklausti ko, kiek ir kada jis gėrė / vartojo;
- 78.5. kviesti GMP;
- 78.6. jei matomas lūpų nudegimas, kol atvyks GMP, duoti nukentėjusiajam mažais gurkšneliais išgerti stiklinę šalto vandens;
- 78.7. nebandyti sukelti vėmimo, nebent nukentėjusysis yra sąmoningas, ką tik apsinuodijo ir tai daryti rekomendavo specialistas.
79. Pirmoji pagalba nuodams patekus per odą:
- 79.1. patikrinti, ar aplinka šalia nukentėjusiojo yra saugi teikti pagalbą;
- 79.2. užtikrinti savo ir nukentėjusiojo saugumą;
- 79.3. jei nukentėjusiojo drabužiai labai užteršti, prieš plaudami atsargiai juos nuvilkti;
- 79.4. pažeistą vietą plauti dideliu kiekiu tekančio vandens apie 20 minučių;
- 79.5. ant nudegimo žaizdų uždėti sausą švarų tvarstį ir atsargiai sutvarstyti;
- 79.6. organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą.
80. Apsinuodyti įkvepiant galima dujomis, aerozoliais, smalkėmis, amoniako garais, anglies dvideginiu, sieros vandeniliu, pesticidais.
81. Pirmoji pagalba apsinuodijimo atveju:

81.1. užtikrinti pakankamą kvėpavimą;

81.2. kviesti GMP (gaisro atveju nedelsiant skambinti tel. 112 ir kviesti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą bei GMP);

81.3. jei nėra pavojaus Jūsų saugumui, kuo greičiau išvesti nukentėjusį iš apnuodytos patalpos, atsagstyti jo apykaklę, pasirūpinti, kad patektų daugiau gryno oro;

81.4. jei žmogus apsinuodijo automobilio išmetamosiomis dujomis uždaroje patalpoje, prieš įeinant į patalpą, plačiai atverti duris, kad nuodingos dujos išsisklaidytų;

81.5. jei surastas nesąmoningas žmogus kanalizacijos šulinyje, duobėje, nereikia bandyti leisti žemyn patiems, nes apsinuodyti ir prarasti sąmonę galite patys, skambinti tel. 112, kviesti specialiąsias tarnybas;

81.6. jei nukentėjusysis prarado sąmonę, atverti kvėpavimo takus ir nustatyti, ar nukentėjusysis kvėpuoja;

81.7. jei nukentėjusysis nekvėpuoja, įpūsti jam oro ir pasirengti atlikti krūtinės ląstos paspaudimus;

81.8. jei nukentėjusysis kvėpuoja, paguldyti į stabilią šoninę padėtį.

82. Pirmoji pagalba nuodams patekus per akis:

82.1. jeigu yra, užsimauti apsaugines pirštines;

82.2. padėti nukentėjusiajam plauti pažeistą akį mažiausiai 20 min. šalto vandens srove, jei nukentėjusysis dėl skausmo negali prasimerkti, švelniai, bet tvirtai pramerkti pažeistos akies vokus (saugoti sveikąją akį);

82.3. uždėti tvarstį ant pažeistosios akies ir sutvarstyti abi akis.

83. Apsinuodijimas įgėlus ar įkandus. Įgėlus vabzdžiui, visada reikia stebėti, ar atsiranda alerginės reakcijos, kurios gali progresuoti iki anafilaksinio šoko.

84. Pirmoji pagalba apsinuodijimo įgėlus ar įkandus atveju:

84.1. jei įkandimo vietoje yra likęs geluonis, atsargiai nubraukti jį nagu ar bukąja peilio geležtės dalimi;

84.2. pakelti įgeltą galūnę, uždėti įkandimo vietoje ledo, laikyti 10 min.;

84.3. jei patinimas plinta ar būklė sunkėja, organizuoti gabenimą į gydymo įstaigą.

85. Pirmoji pagalba gyvatės įgėlimo atveju:

85.1. nukentėjusį atsargiai paguldyti, nuraminti, paprašyti nejudėti;

85.2. numauti nuo įgeltos galūnės žiedus, nuimti laikrodį;

85.3. nuplauti įkandimo vietą;

85.4. įkastą galūnę standžiai sutvarstyti, tvarstyti pradėti nuo įgėlimo vietos galvos link;

85.5. sutvarstyta kūno dalį įtvirtinti;

85.6. kuo greičiau organizuoti gabenimą į gydymo įstaigą.

## XII SKYRIUS

### PIRMOJI PAGALBA NUŠALUS

86. Nušalimai priklauso nuo aplinkos temperatūros, drėgmės, vėjo stiprumo, laiko, kurį žmogus praleidžia toje aplinkoje.

87. Pirmoji pagalba nuožvarbų (galima pažinti iš pažeistoje vietoje esančios patinusios, raudonos, jautrios ir niežtinčios odos) atveju:

87.1. palaikyti pažeistą vietą prie savo kūno kelias minutes, kad apšiltų;

87.2. šildyti pažeistą kūno dalį stipriai spaudžiant rankomis arba glaudžiant prie savo kūno;

87.3. netrinti ir nemasažuoti, o spaudyti, maigyti.

88. Pirmoji pagalba pėdų nušalimo (būdinga tai, kad pažeistų pėdų dalys būna šaltos ir beskausmės, kartais sustingusios, gali atsirasti deginantis skausmas, vėliau oda išblykšta, ant jos atsiranda melsvų dėmių, gali atsirasti pūslių) atveju:

88.1. nuvilkti spaudžiančius drabužius, nuauti batus, nuimti papuošalus bei kitus spaudžiančius dalykus;

88.2. šildyti pažeistas kūno dalis rankomis;

88.3. jei yra galimybė pervilkti sausais laisvais drabužiais, apkloti šiltais apklotais;

88.4. kuo greičiau organizuoti gabenimą į gydymo įstaigą.

89. Pirmoji pagalba nušalimo (būdinga bet kurios kūno dalies jautrumo netekimas, staigus pabalimas, vėliau paraudimas, pūslių atsiradimas, tinimas, pažeistų vietų nejautrumas skausmui)  
atveju:

89.1. šildyti pažeistas kūno dalis rankomis;

89.2. paties nukentėjusiojo rankas uždėti ant veido, ausų ir nosies;

89.3. jei nušalo rankos, atsegti megztinį ir nukentėjusiojo rankas priglauti prie kūno, po to užsegti, kad neprarastų kūno šilumos;

89.4. atlaisvinti arba nuvilkti veržiančius drabužius;

89.5. apkloti, masažuoti, mankštinti;

89.6. galima pamerkti nušalusią kūno dalį į 38–40 laipsnių vandenį;

89.7. pakelti pažeistas kūno dalis, kad sumažėtų tinimas;

89.8. organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą.

**ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „RAUDONKEPURAITĖ“**

**DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO APRAŠYMO**

ĮVYKIO APRAŠYMO DALYS	APRAŠYMAS
<b>Įvykio laikas:</b> metai, mėnuo, diena, valanda, minutės	
<b>Įvykio vieta:</b> tiksli patalpos, lauko vieta	
<b>Vaikų skaičius:</b> buvę grupėje tuo metu	
<b>Darbuotojai:</b> tuo metu dirbę su vaikais (vardas, pavardė, pareigos)	
<b>Įvykio aprašymas:</b> tikslus, smulkus, aiškus	
<b>Kokių imtasi priemonių</b> ir per kokį laikotarpį	
<b>Aprašymą atliko:</b> vardas, pavardė pareigos ir parašas	

Aptarta komisijoje:

Išvados ir rekomendacijos: